

НЕ ЗАБОЛЕЙТЕ МИКРОСПОРИЕЙ.

Микроспория (стригущий лишай) – заразное кожное заболевание человека и животных, которое вызывается микроспорическими грибами.

Источником распространения заболевания среди населения – в большинстве случаев, являются пораженные бродячие кошки и собаки, реже – домашние животные и сам человек.

Заражение происходит при непосредственном контакте с больными животными и человеком через инфицированные ими предметы обихода: постельное белье, полотенца, банные принадлежности, предметы личного туалета, игрушки, ковры, книги, мягкая мебель, уборочный инвентарь, подстилки для животных и предметы ухода за ними;

объекты внешней среды: насыпной материал чердаков, пыль лестничных площадок и мусоросборников, песок детских песочниц, вода мелких водоемов;

парикмахерские приборы: машинки для стрижки волос, расчески, бигуди, кисти для бритья, пеньюары.

Возбудители микроспории могут сохранять жизнеспособность во внешней среде до 10 лет!

Для заболеваемости микроспорией характерна сезонность, подъем начинается в июне, резко нарастает в августе-сентябре и достигает максимума в октябре-ноябре. Чаще болеют дети до 14 лет. Заболевания регистрируются в основном в городах, причем в местах, где сконцентрированы многоэтажные дома с чердаками, утепленными подвалами, мусоропроводами и мусоросборниками, являющимися благоприятными местами обитания бродячих животных, процент пораженности среди которых достигает до 50%.

Скрытый период заражения у человека колеблется от 7 дней до 3 месяцев. При поражении волосистой части головы наблюдается образование одного-двух крупных очагов округлых очертаний и несколько более мелких. Очаги имеют четко выраженные границы, покрытые отрубевидными чешуйками. Почти все волосы в них обломаны и выступают над уровнем кожи, легко извлекаются.

На гладкой коже очаги микроспории размером 1-2 см располагаются в основном на открытых частях и также имеют круглую или овальную форму. Пораженная поверхность покрыта чешуйками, пузырьками и тонкими корочками.

Лечение длительное, при выявлении заболевшего в организованном коллективе, в группу риска попадают все контактирующие с больным. Поэтому в течение 90 дней устанавливается медицинское наблюдение за всеми контактными.

В профилактических целях следует:

- не пользоваться чужими предметами личного пользования;
- не выпускать домашних животных на прогулку без сопровождающих;
- родителям объяснять своим детям о недопустимости игр с бродячими животными;
- периодически обследовать своих домашних животных в ветеринарной станции;
- соблюдать правила личной гигиены – мыть руки с мылом каждый раз после контакта с животными;
- при обнаружении у себя или ребенка признаков кожного заболевания незамедлительно обратиться в кожно-венерологический диспансер по месту жительства, а при появлении заболеваний у домашних животных – в ветеринарную станцию.